

Quảng Nam, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

Hướng dẫn quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hiện nay vườn tiêu kinh doanh đang trong giai đoạn nuôi trái, vườn kiến thiết cơ bản giai đoạn ra lộc non - phân cành. Qua kiểm tra tình hình sản xuất, dịch hại vườn tiêu tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh: Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước... cho thấy, một số vườn tiêu có hiện tượng chết hàng loạt (Quế Phong- Quế Sơn, Bình Quế - Thăng Bình,...). Nguyên nhân chủ yếu là do tuyến trùng gây hại làm tổn thương bộ rễ, kết hợp với việc thiết kế hệ thống thoát nước không hợp lý, sau mỗi đợt mưa kéo dài gây ngập úng cục bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nấm trong đất như: Phytophthora, Fusarium,... xâm nhập, tấn công gây hại. Trên cùng một vườn tiêu, đồng thời xuất hiện bệnh chết nhanh và bệnh chết chậm.

Để giúp các địa phương hướng dẫn nông dân biện pháp quản lý, chăm sóc và phục hồi những vườn tiêu bị nhiễm bị bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Nam hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc và quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm cây Hồ tiêu.

1. Giải pháp trước mắt

Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại.

+ Đối với những cây bị nhiễm bệnh nặng đã bị héo hoặc chết, kịp thời đào bỏ, thu gom toàn bộ tàn dư cây bệnh đưa ra khỏi vườn đốt, tiêu hủy. Sau khi đào bỏ cây bệnh, sử dụng vôi bột với liều lượng 01kg/gốc, xử lý gốc trồng để cách ly, hạn chế nguồn bệnh lây lan.

+ Đối với những cây nhiễm bệnh (biểu hiện vàng lá, rụng lá...) nhưng vẫn còn khả năng phục hồi, sử dụng các loại thuốc trừ tuyến trùng và nấm bệnh như: Tervigo 020 SC + Ridomil Gold 68WG, hoặc Tervigo 020 SC + Carbenzim 500 FL, hoặc Maplogic 90WP + Ridomil Gold 68WG ... hòa nước tưới trực tiếp vào bộ rễ.

Lưu ý:

+ Trước khi xử lý bệnh cần tưới ẩm đất vùng rễ tiêu để tăng hiệu quả sử dụng thuốc. Hạn chế tưới quá ẩm, tưới tràn để tránh bệnh lây lan cả vườn

+ Xử lý 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 7- 10 ngày, nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

+ Sau khi xử lý thuốc lần 3, khoảng 7-10 ngày sử dụng phân DAP hòa loãng nồng độ 2% tưới trực tiếp vào bộ rễ hoặc sử dụng các loại phân bón lá có tác dụng kích thích ra rễ như: amino, Risopla II, Humic,...bổ sung dinh dưỡng giúp cho cây phục hồi.

+ Nếu vườn chưa có mương thoát nước hoặc mương bị bồi lấp, khẩn trương đào mới, nạo vét lại hệ thống mương tiêu (độ sâu 40-50cm) giúp thoát nước tốt trong kỳ mưa rào sắp tới.

2. Giải pháp lâu dài

2.1. Thiết lập vườn trồng mới

- Gốc tiêu đã nhổ tiêu hủy do bị nhiễm bệnh phải được xử lý vôi, quóc lật đất phơi ải ít nhất sau 01 năm mới trồng trồng mới cây hồ tiêu trở lại.

- Khi nhân giống, chỉ sử dụng hom giống khỏe từ những cây không bị bệnh; nguồn đất làm bầu lấy từ vườn không bị bệnh, tốt nhất nên lấy lớp mặt đất chưa trồng trọt để làm bầu (đất bồi ven sông, suối, đất hoang...)

- Chọn đất trồng mới có khả năng thoát nước tốt. Xây dựng hệ thống tưới tiêu hợp lý, nên đào hệ thống thoát nước theo ô bàn cờ, độ sâu 40 - 50 cm. Nếu đất có độ dốc cao thì đào rãnh thoát nước theo hình xương cá, có rãnh chính sâu trên 50 cm xung quanh vườn để vườn dễ tiêu nước khi mưa.

- Bố trí mật độ hợp lý, tránh trồng quá dày làm ẩm độ lớn trong vườn tạo điều kiện cho bệnh phát sinh gây hại.

2.2. Chăm sóc vườn tiêu cũ

- Sau khi thu hoạch cần cắt bỏ những cành sâu bệnh, cành sát mặt đất, cành tược, cành lươn mọc ra từ gốc tiêu tạo độ thông thoáng phần gốc thân, hạn chế các lá ở tầng thấp tiếp xúc với đất nơi có nhiều nguồn nấm bệnh, cắt bỏ những hoa, chùm trái trở rải rác không đúng thời vụ nhằm giúp cây tiêu tập trung dinh dưỡng cho việc phân hóa mầm hoa và ra hoa tập trung trong vụ sau.

- Hồ tiêu là cây trồng không ưa ngập úng, vì vậy trước mùa mưa phải, khơi thông, thiết kế hệ thống thoát nước tốt, không để nước chảy tràn trong vườn tiêu, gốc tiêu nhằm hạn chế bệnh lây lan. Không thiết kế bồn tưới ngay gốc tiêu, chỉ tưới vào khoảng giữa các trụ tiêu, đảm bảo gốc tiêu luôn cao ráo, thoát ẩm.

- Bón phân đầy, đủ cân đối N, P, K; hàng năm, tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục trộn với chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật đối kháng như: Trichoderma, xạ khuẩn Steptomices, vi khuẩn Pseudomonas, Bacillus... bổ sung vi sinh vật có lợi cho đất.

- Thường xuyên kiểm tra vườn cây, đặc biệt là sau thời điểm mưa nhiều, những vườn thoát nước kém,...có biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết đào bỏ những cây bị nhiễm bệnh nặng, thu dọn tàn dư cây bệnh đưa ra khỏi vườn và đốt để loại trừ nguồn bệnh.

Lưu ý:


- Việc đào rãnh, xới xáo để bón phân hữu cơ chỉ được tiến hành trước mùa mưa, khi cây tiêu chưa ra rễ mới. Tuyệt đối không làm tổn thương bộ rễ trong mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại (nấm, tuyến trùng...) xâm nhập

- Không tủ sát gốc các vật liệu như: rơm rạ, lá cây, cỏ rác,... còn tươi, nhất là vào mùa mưa. Đặc biệt hàng năm trước khi tủ gốc nên thu gom các vật liệu cũ của năm trước chưa hoại mục đốt hoặc đưa ra khỏi vườn sau đó mới tiến hành tủ mới để tránh tích lũy nguồn bệnh.

Trên đây là biện pháp quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh, đề nghị Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế, Trung tâm KTNN các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện kịp thời./.

Nơi nhận:

- Sở NN&PTNT Q. Nam (B/c);
- Trung tâm BVTV Miền trung (B/c);
- Phòng NN&PTNT/Kinh tế các huyện, TX, TP;
- Trung tâm KTNN các huyện, TX, TP;
- Báo Quảng Nam;
- Lưu: VT, KT.

CHI CỤC TRƯỞNG

(Handwritten signature)

(Handwritten name: Nguyễn Văn Tân)