

Số: /SNNMT-CCTTBVTV

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

V/v hướng dẫn một số giải pháp khôi  
phục sản xuất sau mưa lớn gây ngập úng  
cực bộ trên địa bàn thành phố

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường

Thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to trên diện rộng, nhất là mưa lớn cực bộ xảy ra ngay sau các đợt mưa lũ kéo dài suốt tháng 10 đến tháng 11 đã tiếp tục gây ra lũ lớn, ngập sâu tại các đô thị và vùng thấp trũng, đặc biệt xảy ra sạt lở đất. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ một số địa phương bị ảnh hưởng, mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn đến tình hình sản xuất của bà con nông dân. Để giúp các địa phương phục hồi sản xuất do bị ảnh hưởng sau mưa lớn, gây ngập úng cực bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn một số giải pháp khôi phục sản xuất sau mưa lũ, cụ thể như sau:

### **1. Đối với cây rau, màu**

a) Đối với rau màu đang giai đoạn phát triển thân lá, cho củ, quả bị hư hại nhẹ, có thể khắc phục

- Tháo nước nhanh, kịp thời khơi thông dòng chảy. Nếu có điều kiện, dùng bình bơm bơm nước rửa sạch đất, bùn dính trên mặt lá.

- Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, tỉa bỏ các lá gốc đã già, vàng úa. Khi đất khô ráo, cần xới xáo, phá váng để tạo độ thoáng cho đất, tránh bị nghẹt rễ.

- Pha loãng phân lân hoặc chế phẩm sinh học tưới gốc giúp phục hồi bộ rễ, kích thích ra rễ mới. Sau khi cây hồi phục và ra rễ mới cần tiếp tục chăm bón, phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng... giúp cây nhanh phục hồi, bón bổ sung phân lân, NPK... để kích thích bộ rễ phát triển, tăng cường khả năng hút dinh dưỡng, cây sinh trưởng nhanh.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi kịp thời phát hiện và phòng chống sâu bệnh, đặc biệt là bệnh hại phổ biến trong giai đoạn này như: bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh lở cổ rễ...

Chú ý: Khi bón phân hoặc phun thuốc cho cây rau màu phải đảm bảo đúng nồng độ, liều lượng và thời gian cách ly.

b) Những diện tích rau màu bị hư hại do mưa ngập không thể khắc phục

Cần tranh thủ tận thu sản phẩm, thu dọn tàn dư, vệ sinh đồng ruộng. Tiến hành cuộc lật lại đất mặt luống khi đủ điều kiện và bố trí sản xuất cây trồng khác phù hợp thời vụ và điều kiện ngoại cảnh của địa phương. Ưu tiên bố trí sản xuất các loại rau ăn lá ngắn ngày phục vụ nhu cầu rau xanh tăng cao sau mưa lũ.

## 2. Đối với cây hoa các loại

a) Do ảnh hưởng của mưa lớn đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây, dập cây và tổn thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh phát sinh gây hại trên cây hoa như bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối thân, bệnh lở cổ rễ, bệnh héo vàng, héo xanh... Vì vậy, cần vệ sinh, khơi thông thoát nước; cắt tỉa cành lá bị dập, bị bệnh và xử lý bệnh trước rồi bổ sung phân kích rễ, phân hữu cơ, khi cây phục hồi mới tiếp tục bón phân vô cơ.

b) Đối với bệnh héo vàng do nấm *Fusarium* Sp. và héo xanh do vi khuẩn gây hại, do chưa có thuốc đặc trị nên cần chú ý nhổ bỏ cây bị bệnh, xử lý vôi hoặc nấm *Trichoderma* để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng. Có thể kết hợp xử lý hoặc phòng bệnh bằng các loại thuốc: Bệnh héo vàng: Aliette 800WG, Agri-Fos 400SL, *Trichoderma* ...; bệnh héo xanh: Novinano 55WP, New Kasuran 16.6WP, Kasumin 2SL, BL. Kanamin 50WP,...

c) Đối với bệnh lở cổ rễ sử dụng một trong các loại thuốc: Aliette 80WG, Validacin 5SL... để phòng trừ.

d) Đối với bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối thân sử dụng một trong các loại thuốc: Nativo 750WG; Ridomil Gold 68WG; Daconil 500SC, Anvil 5SC, Score 250EC, Manozeb 80WP...

Chú ý:

- Để tăng cường hiệu lực của thuốc trong điều kiện thời tiết mưa khi phun thuốc cần pha thêm chất bám dính nhằm tăng hiệu quả phòng trừ.

- Kê chậu và bổ sung thêm giá thể lên mặt chậu để rút nước nhanh tránh úng nước.

- Ngoài ra, trên cây hoa còn có các đối tượng như bệnh gỉ sắt, rầy rệp, bọ trĩ, dòi đục lá... gây hại rải rác, cần chú ý theo dõi để xử lý hiệu quả.

## 3. Đối với cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm

a) Đào mương, đánh rãnh thoát nước triệt để, đặt biệt các vùng trũng.

b) Tiến hành cắt tỉa các cành lá sâu bệnh, cành bị gãy, tổn thương do mưa lũ, vệ sinh đồng ruộng để tạo sự thông thoáng cho vườn hạn chế nấm bệnh lây lan.

Tại các vết cắt tỉa dùng vôi hòa loãng hoặc các loại thuốc trừ nấm cho cây ăn quả để bôi lên vết thương giúp hạn chế sự xâm nhập của nấm bệnh.

c) Gia cố cây bị đổ ngã, tiến hành dựng thẳng gốc cây, cố định bằng cọc tránh để gốc lung lay làm đứt rễ.

d) Sau khi đất rút nước, xới phá vầng mặt đất xung quanh gốc cây (độ sâu 5-10cm) để rễ cây dễ hút được oxy. Bổ sung phân hữu cơ hoai mục kết hợp với chế phẩm *Trichoderma* để tăng vi sinh vật có lợi, phục hồi đất, phun phân bón lá và sử dụng chất kích thích ra rễ mới cho cây ăn quả, cây công nghiệp theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với những vườn cây đang đậu quả non

hoặc quả trong giai đoạn phát triển: Phun phân bón lá có chứa Fe, Bo, Ca, Cu, B, Zn, .. để tránh hiện tượng nứt, rụng quả.

đ) Sau 7-10 ngày khi cây phục hồi, bón bổ sung NPK cân đối (ưu tiên tỷ lệ lân và kali cao để cứng cây, tăng sức chống chịu).

e) Theo dõi thường xuyên vườn cây, để kịp thời phát hiện bệnh và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đối với bệnh do nấm gây ra, có thể phun, tưới thuốc trừ nấm (Aliette 80WG, Ridomil Gold 68WG, Acrobat MZ 90/600WP, Trichoderma ...) hoặc các chế phẩm sinh học đối kháng nấm hại có trong danh mục thuốc được phép sử dụng, nồng độ và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Nhận được văn bản này, đề nghị các địa phương hướng dẫn, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo)
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Trung tâm Khuyến nông;
- Lưu: VT, CCTTBVTV, Yên.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Vũ Thị Bích Hậu**