

THÔNG BÁO

Hướng dẫn quản lý dịch hại cây lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng vụ Đông Xuân 2022 - 2023

Đến nay, lúa Đông Xuân đại trà đang giai đoạn đứng cái - làm đòng, một số diện tích lúa nước trời sạ sớm đã trở, đây là thời điểm xung yếu quyết định lớn đến năng suất cây lúa. Hiện nay, trên đồng ruộng các đối tượng sâu bệnh đã xuất hiện và gây hại trong đó nổi lên các đối tượng cần quan tâm như: sâu cuốn lá nhỏ phát sinh diện rộng và gây hại cục bộ nhiều nơi; bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên các giống nhiễm. Với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, sáng sớm sương mù, lạnh về đêm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh nêu trên phát sinh gây hại mạnh trong thời gian đến.

Để quản lý tốt dịch hại trên cây lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng, nhằm bảo vệ an toàn sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam hướng dẫn một số biện pháp sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn

- *Đối với bệnh đạo ôn lá, cổ lá:* Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là những ruộng bón thừa đạm, ruộng gieo sạ giống nhiễm để kịp thời phát hiện bệnh. Khi có tỷ lệ bệnh từ 3-5% số lá bị bệnh, cần giữ đủ nước trên ruộng, tạm dừng bón thúc đạm và tiến hành dùng thuốc có hoạt chất Isoprothiolane, Tricyclazole (*Fuji-One 40 EC, Beam 75 WP, Filia 525 SE, Flash 75 WP,...*) để phun trừ.

- *Đối với bệnh đạo ôn cổ bông:* Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng trong giai đoạn lúa đòng - trở để kịp thời phát hiện bệnh, nhất là những ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá. Đối với các giống như BC15, KD18, IR17494 (13/2), TBR 225, Bắc Thịnh,... trước khi trở 5 - 7 ngày, tiến hành dùng các loại thuốc đặc hiệu như đối với bệnh đạo ôn lá đã nêu trên để phòng bệnh. Nếu chưa phun thuốc kịp thời ở giai đoạn trước trở thì phun ở giai đoạn sau trở từ 5-7 ngày. Tốt nhất là phun khi lúa bắt đầu trở lác đác.

2. Đối với sâu cuốn lá nhỏ

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1-3), khi phát hiện sâu với mật độ từ 20 con/m² trở lên thì tiến hành dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất Chlorantraniliprole + Thiamethoxam, Emamectin Benzoate (*Virtako 40WG, Angun 5 WG,...*) để phun trừ ngay.

3. **Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:** Đề nghị hướng dẫn người dân thường xuyên thăm đồng, vạch gốc lúa để kịp thời phát hiện rầy gây hại, phải

quan sát khắp mặt ruộng để phát hiện các “ổ rầy” cục bộ. Khi phát hiện rầy có mật độ trung bình từ 2 – 3 con/dảnh lúa (khoảng 1.000 - 2.000 con/m²) thì dùng các loại thuốc có hoạt chất Pymetrozine, Imidacloprid (*Chess 50WG, Map-Jono 700 WP,...*) để phun trừ. Khi phun trừ rầy cần phải khoanh vùng và phun kỹ các “ổ rầy” để diệt trừ triệt để, tránh lây lan.

Lưu ý: Để đạt hiệu quả phòng trừ cao, khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”, đặc biệt phun đúng lượng nước thuốc trên đơn vị diện tích theo khuyến cáo trên nhãn. Phun chậm ướt đều gốc lúa, giữ nước trong ruộng khi phun (đối với trừ rầy) và mặt lá (đối với trừ đạo ôn).

Trên đây là nội dung hướng dẫn quản lý dịch hại cây lúa giai đoạn đứng cái - làm đòng vụ Đông Xuân 2022-2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn phòng trừ hiệu quả./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Nam (b/c);
- Trung tâm BVTV miền Trung (b/c);
- Trung tâm Khuyến nông;
- Phòng NN&PTNT/Kinh tế các huyện, TX, TP;
- Trung tâm KTNN các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Vũ