

THÔNG BÁO

Hướng dẫn chăm sóc và quản lý sinh vật gây hại lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 giai đoạn đồng - trổ

Đến nay, lúa Đông Xuân đại trà đang giai đoạn đứng cái - làm đồng, một số diện tích lúa nước trời sạ sớm đã trổ, đây là thời điểm xung yếu quyết định năng suất cây lúa ở cuối vụ. Nhìn chung, các trà lúa sinh trưởng phát triển tương đối tốt, tuy nhiên, hiện tại trên đồng ruộng đang có một số đối tượng sinh vật gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn... Với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, sáng sớm sương mù, lạnh về đêm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh nêu trên phát sinh gây hại mạnh trong thời gian đến.

Để bảo vệ an toàn sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam hướng dẫn một số biện pháp sau:

1. Biện pháp chăm sóc

- Giai đoạn đồng - trổ cây lúa rất cần nước, cần đưa nước vào ruộng duy trì ở mực nước khoảng 5 - 10 cm liên tục cho đến khi lúa trổ vào chắc.

- Đối với lúa sạ muộn chưa bón đồng, cần bón đồng đúng thời điểm để cây lúa phân hoá đồng tốt, loại phân và liều lượng bón theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đối với những ruộng lúa bị ngộ độc hữu cơ, ngột rế - vàng sinh lý cần phải thay nước từ 1 - 2 lần, sau đó bón bổ sung thêm phân DAP (1 - 2kg/sào) và phun phân qua lá để lúa mau hồi phục.

2. Quản lý sinh vật gây hại (SVGH)

a. Bệnh đạo ôn

- Đối với bệnh đạo ôn lá, cổ lá: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là những ruộng bón thừa đạm, ruộng sạ giống nhiễm để kịp thời phát hiện bệnh. Khi có tỷ lệ bệnh từ 3 - 5% số lá bị bệnh, cần giữ đủ nước trên ruộng, tạm dừng bón thúc đạm và tiến hành dùng thuốc có hoạt chất Isoprothiolane, Tricyclazole (Fuji-One 40 EC, Beam 75 WP, Filia 525 SE, Flash 75 WP,...) để phun trừ.

- Đối với bệnh đạo ôn cổ bông: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng trong giai đoạn lúa đồng - trổ để kịp thời phát hiện bệnh, nhất là những ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn lá. Đối với các giống như BC15, HT1, TBR225, Thiên ưu 8... trước khi trổ 5 - 7 ngày, tiến hành dùng các loại thuốc đặc hiệu như đối với bệnh đạo ôn lá (đã nêu ở trên) để phòng bệnh. Nếu chưa phun thuốc kịp thời ở giai đoạn trước

trở thì phun ở giai đoạn sau trở từ 5 - 7 ngày. Tốt nhất là phun khi lúa bắt đầu trở lác đác.

b. Rầy nâu, rầy lưng trắng

Đề nghị khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, vạch gốc lúa để kịp thời phát hiện rầy gây hại, phải quan sát khắp mặt ruộng để phát hiện các “ổ rầy” cục bộ. Khi phát hiện rầy có mật độ bình quân từ 2 - 3 con/dảnh lúa (khoảng 1.000 - 2.000 con/m²), thì sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Pymetrozine, Imidacloprid (*Chess 50WG, Map-Jono 700 WP,...*) để phun trừ. Khi phun trừ rầy cần phải khoanh vùng và phun kỹ vào các “ổ rầy” để diệt trừ triệt để, tránh lây lan.

c. Sâu cuốn lá nhỏ

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu non tuổi nhỏ (tuổi 1 - 3), khi phát hiện sâu với mật độ từ 20 con/m² trở lên thì tiến hành dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất Chlorantraniliprole + Thiamethoxam, Emamectin Benzoate (*Virtako 40WG, Angun 5 WG,...*) để phun trừ ngay.

Lưu ý: Để đạt hiệu quả phòng trừ cao, khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”, đặc biệt phun đúng lượng nước thuốc trên đơn vị diện tích theo khuyến cáo trên nhãn. Phun chậm ướt đều gốc lúa, giữ nước trong ruộng khi phun (đối với trừ rầy) và phun đều khắp mặt lá (đối với trừ bệnh đạo ôn).

Trên đây là nội dung hướng dẫn quản lý SVGH cây lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 giai đoạn đồng - trở, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn phòng trừ hiệu quả./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Nam (B/c);
- Trung tâm BVTV miền Trung (B/c);
- Trung tâm Khuyến nông;
- Phòng NN&PTNT/KT các huyện, TX, TP;
- Trung tâm KTNN các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Vũ