

Phụ lục
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIỐNG

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-TT-CLT ngày tháng năm 2024
của Cục Trồng trọt)

Tên cơ quan đề nghị: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Số 119, đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại/fax: 02353852629 - **Email:** snnptnt@quangnam.gov.vn

1. Tên giống cây trồng: Bảy lá một hoa Quảng Nam, tên khoa học: *Paris polyphilla* Smith, họ: Hành tỏi - *Liliaceae*

2. Thông tin về giống cây trồng

- Thân: Là loại cây thân thảo nhỏ, sống lâu năm, có 1 thân thẳng đứng, không phân nhánh (hiếm khi có 2-3 thân), thân rụi hằng năm, để 1 sẹo lõm trên củ (thân rễ). Thân có màu xanh hoặc hơi tím; đường kính thân 0,5-1,0cm; chiều cao 0,5-2,2m; phía gốc có một số lá thoái hóa thành vảy bao lấy thân.

- Lá: Mọc vòng giữa thân khí sinh, có 1 tầng lá, có từ 3-10 lá, thường 7 lá. Phiến lá hình mác rộng, đầu phiến lá nhọn, mép lá nguyên, hai mặt nhẵn. Chiều dài lá 15-25cm, rộng lá 4-8cm. Cuống lá dài 1,5-3cm. Màu sắc lá có màu xanh có vệt tím hoặc không.

- Hoa: Hoa đơn độc ở đỉnh cành, cuống hoa dài 15-30cm. Lá đài hoa màu xanh, số lá đài luôn bằng với số lá của cây, dài 3-7cm, rời từng lá một, hình mũi giáo và không rụng. Cánh tràng hình sợi rủ xuống màu vàng nâu có chiều dài bằng hoặc ngắn hơn lá đài. Nhị nhiều, mảnh, có bao phấn màu vàng nâu; nhụy màu tím đỏ. Hoa ra vào tháng 02-4 hằng năm.

- Quả: Quả mọng khi chín có màu tím đen; hình tháp tròn, có cạnh. Quả thường chín vào tháng 10-12 hằng năm. Mỗi quả có từ 30 hạt trở lên. Hạt có màu đỏ, hình cầu hoặc hình bầu dục, nhẵn.

- Củ (thân rễ): Củ to, hình trụ, nạc, nằm ngang, chia nhiều đốt, có những ngấn ngang và sẹo to do thân khí sinh rụi hằng năm để lại. Vỏ củ có màu nâu đen. Thịt củ có màu vàng trắng đến xám vàng, có vị đắng hơi cay. Kích thước củ dài 5-15cm, đường kính củ 0,5-4,0cm; thân rễ có nhiều đốt chứa mầm ngủ có thể làm giống.

3. Giá trị sử dụng

☒ Làm dược liệu

4. Kỹ thuật gieo trồng

- **Yêu cầu điều kiện sinh thái** (vĩ độ, nhiệt độ, đất đai...): Nhiệt độ dao động trung bình từ 15°C đến 22°C, ẩm độ không khí trung bình 80-90%; lượng mưa trung bình 1.500-2.000 mm/năm và phân bố đều. Độ cao 550-1.900m so với mực nước biển. Độ tàn che từ 0,7 trở lên.

- **Thời vụ trồng:** từ tháng 01 đến tháng 3 hằng năm tại Quảng Nam.

- **Mật độ, khoảng cách:** Khoảng 10.000 cây/ha, khoảng cách 1,0 m x 1,0m.

- **Sâu bệnh hại chính:** Ít, hiện tại chỉ ghi nhận chuột và chim gây hại.

5. Cảnh báo các tác hại: Không./.